

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Säuglinge und Kleinkinder

Alter →	1. Lebensjahr						2. Lebensjahr			5. Jahr	6. Jahr		
	7. Wo	3. Mo.	5. Mo.	6. Mo.	7. Mo.	11. Mo.	12. Mo.	13. Mo.	14. Mo.	20.-24. Mo.			
↓ Impfung													
Rotavirus (RV)	RV 2 bzw. 3, Abstand mind. 4 Wo. in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff												
Diphtherie (DIP)								3. 6-fach frühestens 6 Mo. nach					
Tetanus (TET)								2. Teil- impfung					
Pertussis (PEA)		1. 6-fach	2. 6-fach					3. PNC frühestens 6 Mo. nach					
Poliomyelitis (IPV)								2. Teil- impfung					
Haemophilus infl. B (HIB)								3. PNC frühestens 6 Mo. nach					
Hepatitis B (HBV)								2. Teil- impfung					
Pneumokokken (PNC)		1. PNC	2. PNC					2. Teil- impfung					
Mumps								MMR					
Masern (MMR)								2 Impfungen Abstand mind. 4 Wo.					
Röteln													
Meningokokken^{1,2}								1 x MEC-C					
FSME								1. FSME	2. FSME	3. FSME	FSME		
Varizellen (VZV)								VZV 2 Impfungen Abstand mind. 4, vorzugsweise 6 Wo.					
Hepatitis A (HAV)									1.HAV	2.HAV			
Influenza (IV)³								IV jährlich					

¹ MEC-C: konjugierter MenC-Impfstoff bei Erstimpfung ab dem zwölften Monat nur eine Dosis (kann im dritten Monat erstmals geimpft werden, dann zweite Impfung im Abstand von mindestens acht Wochen) Tab. 3
² MenB: -Individualimpfung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat; Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken
³ IV: Bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum achten Lebensjahr) zwei Impfungen mit mindestens vier Wochen Abstand empfohlen

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Schulkinder

Alter →	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
↓ Impfung									
Diphtherie (dip)									
Tetanus (TET)	4-fach	nachholen						4-fach ¹	
Pertussis (PEA)									
Poliomyelitis (IPV)									
Hepatitis B (HBV)	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder Auffrischung								
Mumps									
Masern (MMR)	(MMR Nachholen bei Ungeimpften oder nur 1x Geimpften)								
Röteln									
Humane Papillomviren (HPV)²				2 x HPV (0/6 Monate)			2 x HPV ³ (0/6 Monate)		
Varizellen (VZV)	2 x VZV (wenn nicht bereits 2x geimpft oder Erkrankung durchgemacht)								
FSME	FSME								
Meningokokken⁴ (MEC4)	MEC4								
Influenza (IV)	IV jährlich								

¹ Für Kinder, die vorher nur eine dip+Tet+IPV Impfung erhalten haben Tab. 4
² Die HPV-Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich, ab dem vollendeten 9. Lebensjahr (= 9. Geburtstag) begonnen werden
³ Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis
⁴ Nachholschema für MenB Individualimpfung und Indikationsimpfung für Risikopersonen siehe Kapitel Meningokokken

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Erwachsene

Erwachsene mit vorliegender Grundimmunisierung gemäß den Empfehlungen*

Alter →	18.-20. Jahr	30. Jahr	40. Jahr	50. Jahr	60. Jahr	65. Jahr	70. Jahr	75. Jahr	80. Jahr usw.
↓ Impfung									
Diphtherie (dip)									
Tetanus (TET)	alle 10 Jahre auffrischen					alle 5 Jahre auffrischen			
Pertussis (PEA)									
Poliomyelitis (IPV)									
Humane Papillomviren (HPV)	gegebenenfalls nachholen								
Mumps									
Masern (MMR)	gegebenenfalls nachholen								
Röteln									
FSME	alle 5 Jahre auffrischen					alle 3 Jahre auffrischen			
Pneumokokken (PNC)	siehe Abschnitt Pneumokokken								
Herpes Zoster (HZV)	einmalige Gabe								
Influenza (IV)	IV jährlich								

* Nachholimpfplan für Personen konsultieren, bei denen die Grundimmunisierung ganz oder teilweise fehlt. Tab. 5