

MASERN
SIND KEIN
KINDER-
SPIEL.

Schützen
Sie sich
und Ihre
Kinder!

MIT
DER MMR-
GRATIS-
IMPFUNG

www.keinemasern.at

Kostenfreies Impfprogramm 2016

Säuglinge und Kleinkinder

Alter→ ↓Impfung	1. Lebensjahr						2. Lebensjahr
	7. Woche	3. Monat	5. Monat	6. Monat	11. Monat	12. Monat	
Rotavirus (RV)	RV 2 bzw. 3 Teilimpfungen in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff, Abstand mind. 4 Wochen						
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HiB) Hepatitis B (HBV)		1. 6-fach- Impfung	2. 6-fach- Impfung			3. 6-fach-Impfung frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung	
Pneumokokken (PNC)		1. PNC	2. PNC			3. PNC frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung	
Mumps Masern (MMR) Röteln					MMR 2 Impfungen Abstand mind. 4 Wochen		

Impfkalender des kostenfreien Impfprogramms für Säuglinge und Kleinkinder

Schulkinder

Alter→ ↓Impfung	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr	12. Jahr	13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
Diphtherie (dip) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV)	4-fach- Impfung	nachholen bei Kindern, die im 7. Lebensjahr nicht geimpft wurden					1		
Hepatitis B (HBV)	Grundimmunisierung (0/1/6 Monate) oder auffrischen								
Mumps Masern (MMR) Röteln	MMR nachholen								
Meningokokken (MEC-4)					MEC-4				
Humane Papillomaviren (HPV)²					2 x HPV (0/6 Monate)		2 x HPV ^{3,4} (0/6 Monate)		

Impfkalender des kostenfreien Impfprogramms für Kinder im schulpflichtigen Alter (vollendetes 6. bis vollendetes 15. Lebensjahr)

¹ Kinder, die im 7.–9. Lebensjahr nur eine dip-Tet-IPV-Impfung erhalten haben, sollen spätestens bei Schulaustritt eine Impfung mit einer Pertussiskomponente erhalten.

² Die HPV Impfung im 1+1 Schema, soll so früh wie möglich ab dem vollendeten 9. Lebensjahr begonnen werden.

³ Catch-up Programm, ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zu einem günstigen Selbstkostenpreis.

⁴ Empfehlung für das 15. Lebensjahr stützt sich auf Empfehlungen gemäß der Weltgesundheitsorganisation, WHO:

www.who.int/entity/wer/2014/wer8943.pdf?ua=1; abweichend von der derzeit gültigen Fachinformation des tetravalenten Impfstoffes.



Wo?

- » Öffentliche **Impfstellen der Bundesländer**
- » **Kinderärztin und Kinderarzt** oder
Hausärztin und Hausarzt
- » Im Rahmen der **Schulimpfaktion**

Die Impfungen sollten zum **frühestmöglichen Zeitpunkt** erfolgen. **Fehlende Impfungen** sollten ehestmöglich, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte die Möglichkeit eines Gesprächs mit der Impfärztin oder dem Impfarzt. Bringen Sie bitte alle vorhandenen **Impfaufzeichnungen** (Impfpass, Impfkarte) zum vorgesehenen Impftermin mit.

Weitere Informationen auf der Website
des Bundesministeriums für Gesundheit:
bmg.gv.at/impfen

